

Kobberspiral

Navn _____

Fødselsdato _____

Gravid

Etter fødsel (etter 48 timer og før 6 uker)

Har en seksuelt overførbart infeksjon (klamydia, mykoplasma eller gonore)

Symptomer eller tegn på en seksuelt overførbart infeksjon

Symptomer på en bekkeninfeksjon

Udiagnostisert vaginalblødning

Kreft i livmorhals, endometriet eller eggstokker

SLE (systemisk lupus erytematosus) med alvorlig trombocytopeni

Test for seksuelt overførbare infeksjoner

Tatt ved innsetting

Tatt før innsetting

Ikke indikasjon

Test for klamydia (eventuelt mykoplasma og gonore ved indikasjon).

Medikamenter

Det er ikke sett interaksjoner mellom kobberspiral og andre medikamenter, som vil føre til en nedsatt prevensjonseffekt.

NB! Pasienter som får hiv-behandling bør få utskrevet prevensjon i samarbeid med infeksjonsmedisiner.

Kartlegg graviditetsrisiko dersom pasienten ikke bruker prevensjon eller nylig har hatt prevensjonssvikt

Har pasienten brukt nødprevensjon de siste 2 månedene?

NEI (ikke brukt nødprevensjon)

Dato for første dag i siste mens: _____

Samleie uten kondom etter denne datoen?

NEI: start med spiral**JA:** vent til 3 uker etter siste ubeskytta samleie og start ved negativ gravitest**JA (brukt nødprevensjon)**

Hatt samleie uten kondom siste 3 uker?

JA: vent til 3 uker etter siste ubeskytta samleie og start ved negativ gravitest**NEI:** ta en gravitest i dag. Om testen er negativ: start med spiral**Informasjon**

Pasienten er gitt informasjon om vanligste bivirkninger.

Dato _____ Helsepersonell _____