



GONORÉ

Informasjon om behandling med ceftriaxon

Antibiotika skal gis til alle som har fått påvist gonoré, og til nåværende og/eller tidligere fast partner som antas å være smittet. Før behandling skal det tas dyrkningsprøver.

smittet deg eller som du kan ha smittet, får beskjed.

Neste time for kontrollprøve:

BEHANDLING

Ceftriaxon 1 g. Injeksjon med sprøyte som settes i rumpemuskel av lege eller sykepleier.

Dato: _____

Klokken: _____

VANLIGSTE BIVIRKNINGER

Diaré og luft i magen, magesmerter, kvalme, hodepine og svimmelhet. Noen kan oppleve smerte, kløe og utslett der sprøyten ble satt. De med vulva og skjede kan få soppinfeksjon etter kuren.

Husk at kondom beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner som gonoré.

SEX

Kuren virker over tid, så du kan ikke regnes som frisk før du har tatt en ny prøve som er negativ. Det anbefales pause fra seksuell kontakt (heller ikke samleie med kondom) fram til du har fått svar på kontrollprøven.

KONTROLL

Behandlingen kurerer gonoré hos de aller fleste, men en sjelden gang fungerer den ikke. Du må derfor komme for en ny prøve (kontrollprøve) om 3 uker. Etter smittevernloven har du faktisk en lovpålagt plikt til å komme for kontrollprøve.

BESKJED TIL PARTNER

Det er viktig at alle partnere som kan ha