



KLAMYDIA

Informasjon om behandling med doksyklin

Antibiotika skal gis til alle som har fått påvist klamydiabakterien ved testing. Det gis også til nåværende og/eller tidligere fast partner, som antas å være smittet.

BEHANDLING

Doksyklin 100 mg (14 tabletter)

1 tablet tas 2 ganger daglig i 7 dager – ta tabletten med rikelig drikke, helst vann, men ikke melk eller melkeprodukter. Skal tas utenom andre medisiner.

Personer som bruker legemiddelet Isotretinoïn (et medikament mot kviser) skal ikke bruke doksyklin.

Doksyklin skal ikke tas sammen med melk og melkeprodukter (men det er uprørlig om du for eksempel spiser yoghurt til frokost og så tar en tablet midt på dagen). Du skal heller ikke ta jerntabletter mens du tar doksyklin. Dette fordi jern og kalsium (i melk) kan nedsette effekten av behandlingen.

Gravide og ammende skal ha annen behandling.

VANLIGSTE BIVIRKNINGER

Mage-tarm-besvær. Kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, løs avføring.

Hvis du opplever ubehagelig kvalme eller oppkast, kan det hjelpe å ta tabletene samtidig med et måltid. Skulle du kaste opp innen to timer etter at du har tatt en tablet kan det være den ikke har effekt. Ta en ny

tablett etter noen timer, og ring oss hvis du er usikker om du trenger flere tabletter.

Når du behandles med doksyklin kan soling gi kraftig solbrenhet og hudutslett. Vær forsiktig med sterkt sol i opptil to uker etter siste tablet. Hvis det er sterkt sol bør du bruke solkrem med høy solfaktor og dekke deg til eller oppholde deg i skygge. Du skal heller ikke ta solarium før det har gått to uker etter siste tablet.

SEX

Det anbefales pause fra seksuell kontakt (heller ikke med kondom) i 7 dager fra og med den dagen du starter med behandlingen. Dette for å unngå nysmitte og fordi underlivet trenger ro.

KONTROLL

Det er ikke anbefalt kontrollprøve. Hvis du tar en prøve de første 4 ukene etter behandlingen, kan prøven bli positiv selv om du er ferdig behandlet. Det er fordi døde bakterier kan bli liggende en stund etter behandlingen og gjør at testen blir positiv.

BESKJED TIL PARTNER

Det er viktig at alle partnere som kan ha smittet deg eller som du kan ha smittet med klamydia, får beskjed.

Husk at kondom beskytter mot seksuelle overførbare infeksjoner som klamydia.