



GONORÉ

Informasjon om behandling med ceftriaxon.

Antibiotika skal gis til alle som har fått påvist gonré, og til nåværende og/eller tidligere fast partner som antas å være smittet. Før behandling skal det tas dyrkningsprøver.

BEHANDLING

Ceftriaxon 1 g. Injeksjon med sprøyte som settes rumpemuskelen av lege eller sykepleier.

VANLIGSTE BIVIRKNINGER

Diaré og luft i magen, magesmerter, kvalme, hodepine og svimmelhet. Noen kan oppleve smerte, kløe og utslett der sprøyten ble satt. Kvinner kan få sopp i skjeden etter kuren

SAMLEIE

Det anbefales pause fra samleie (heller ikke samleie med kondom) i 7 dager fra og med den dagen du starter med behandlingen. Dette for å unngå nysmitte og fordi underlivet trenger ro.

Kuren virker over tid, så du kan ikke regnes som frisk før du har tatt en ny prøve som er negativ. Det anbefales pause fra samleie (heller ikke samleie med kondom) fram til du har fått svar på kontrollprøven

KONTROLL

Behandlingen kurerer gonoré hos de aller fleste, men en sjelden gang fungerer den ikke. Du må derfor komme for en ny prøve (kontrollprøve) om 2 uker. Etter smittevernloven har du faktisk en lovpålagt plikt til å komme for kontrollprøve.

Neste time for kontrollprøve:

Dato: _____

Klokken: _____

Husk at kondom beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner som gonoré.