

Gestagenpiller eller p-stav

Navn _____ Fødselsdato _____

Kontraindikasjoner

- Gravid
- Udiagnostisert vaginalblødning
- Aktiv venøs tromboembolisk sykdom
- Alvorlig leversykdom: leverkreft, dekompensert levercirrhose eller hepatocellulært adenom
- Brystkreft (nå eller tidligere)
- SLE (systemisk lupus erytematosus) med positive antifosfolipid antistoffer

Medikamenter

- Pasienten bruker én eller flere av følgende medikamenter med alvorlig interaksjon:
 - Johannesurt
 - Antiepileptika/antikonvulsiva: fenytoin, karbamazepin, babilurater, primidon, topiramat, okskarbazepin, perampanel og eslikarbazepinacetat.
 - Antibiotika: rifampicin og rifabutin
 - Antivirus: ritonavir.

Øvrige ikke-enzyminduserende medikamenter, inkludert alle antibiotika og midler mot sopp, parasitter og virus, vil ikke nedsette effekten av gestagenpiller eller p-stav, så lenge de ikke medfører langvarig oppkast og diaré hos pasienter som tar gestagenpiller. NB! Pasienter som får hiv-behandling bør få utskrevet prevensjon i samarbeid med infeksjonsmedisiner.

Kartlegg graviditetsrisiko dersom pasienten ikke bruker prevensjon eller nylig har hatt prevensjonssvikt

Har pasienten brukt nødprevensjon de siste 2 månedene?

 NEI (ikke brukt nødprevensjon)

Dato for første dag i siste mens: _____

Samleie uten kondom etter denne datoen?

- NEI:** start med prevensjon
- JA:** start med prevensjon eller vent, gravitest 3 uker etter siste ubeskytta samleie.

 JA (brukt nødprevensjon og har tatt Ellaone de siste 5 døgn)

- Vent minst 5 døgn fra inntak av Ellaone før oppstart med prevensjon
- Gravitest 3 uker etter siste ubeskytta samleie.

 JA (brukt nødprevensjon men har ikke tatt Ellaone de siste 5 døgn)

Hatt samleie uten kondom siste 3 uker?

- JA:** start med prevensjon, gravitest 3 uker etter siste ubeskytta samleie.
- NEI:** ta en gravitest i dag. Om testen er negativ: start med prevensjon.

Informasjon

- Pasienten er gitt informasjon om bruk og vanligste bivirkninger.

Dato _____ Helsepersonell _____